



# پژوهش پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران

دوره یازدهم شماره ۱ (پیاپی ۴۰) فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ - شماره استاندارد بین المللی ۱۷۳۵-۷۰۱۲

۱	ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان سیدالشهداء سمیرم ..... عاطفه افشاری، مریم پیروزی، سمهیه افشاری، کاوک حجاب
۹	مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد مبتلا به بنا تعالی اسمی مژور و سالم در شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۳ ..... یعقوب مدملی، رضا بیرانوند، نسرین کرکینی، حمیده مشعلچی، مرضیه بیگم بیکدلی شاملو، حمید کریمی
۱۷	تأثیر برنامه خودتدبیری پس از ترخیص بر تعییت از رژیم درمانی بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب ..... مصطفویه ذاکری مقدم، سجاد ابراهیمی، هومن شهسواری، حمید حقانی
۲۵	بررسی ارتباط حسن انسجام، خودلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان ..... محمد نریمانی، مظفر غفاری
۳۴	کیفیت زندگی و ارتباط آن با ویژگیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و سلامتی بازنیستگان شهر تبریز ..... مصطفویه مالک، هادی حسنخانی، علی درویش پور کاخکی، محمد اصغری جعفرآبادی، محمد رضا منصوری آرانی، سارا محمد نژاد
۴۲	بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل بر میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران سال ۱۳۹۲ ..... لیلا صالحی زاهد، منیره اسدی، کامران کردیمیر
۵۱	بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه ..... مصطفویه رستمی، محمد رضا موقری، ترانه تقی لاریجانی، عیاس مهران
۶۲	تجربه زندگی با همسر معتاد: یک مطالعه پدیدار شناسی ..... علیرضا نیکبخت نصرآبادی، فاطمه پاشایی ثابت، علیرضا بستامی
۷۶	تأثیر عوامل زمینه ای بر رفتار اطلاع یابی سلامت بیماران مبتلا به دیابت شهر اصفهان ..... فیروزه زارع فراشبندی، آناسبک لاله زاریان، علی رضا رحیمی، اکبر حسن زاده
۸۸	بررسی میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان ..... زهرا جعفری، لیلا خانلی مجن، مریم رسولی، احمد رضا باگستانی، علیرضا قهری سرابی، اعظم شیرین آبادی فراهانی، حسین شبری

**به نام خداوند جان و خرد**  
**مجله پژوهش پرستاری**  
**علمی - پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران**  
**دوره یازدهم - شماره ۱ (پیاپی ۴۰) - فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵**

- صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
- مدیر مسؤول: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
- سردبیر: دکتر زهره پارسا یکتا
- معاون سردبیر: دکتر افسانه صدوqi اصل - دکتر شهرزاد پاشایی پور
- شماره پروانه انتشار: ۱۴۲۶۱۵ /۱۸ مورخ ۸۵/۵
- شماره بین المللی منبع: ۰۱۲-۷۰۱۷۳۵
- شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: e-ISSN ۱۷۳۵-۹۰۷۴

**• شورای نویسندها (به ترتیب حروف الفبا):**

- دکتر فضل ا... احمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر زهره پارسا یکتا، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر مهرنوش پازارگادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر حمیدرضا خانکه، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر مهدی رهگذر، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر سادات سیدباقر مذاج، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر نعیمه سید فاطمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر عباس عبادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
- دکتر مسعود فلاحتی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر علی محمدپور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد
- دکتر عیسی محمدی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر رضا نگارنده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

**• ویراستار انگلیسی: دکتر منیر مظاہری**

**• ویراستار فارسی: دکتر زهره پارسا یکتا**

**• حروفچینی و صفحه‌آرایی: اکرم پورولی**

**• طراح جلد: اکرم پورولی**

**• ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران**

**• نشانی: تهران - میدان توحید - دانشکده پرستاری و مامایی تهران**

**• کدپستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱، صندوق پستی: ۱۴۱۹۵/۳۹۸، تلفن و نمبر: ۶۶۵۹۲۵۳۵**

**E-mail: info@ijnr.ir , Website: www.ijnr.ir**

# تأثیر عوامل زمینه‌ای بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران مبتلا به دیابت شهر اصفهان

فیروزه زارع فراشیندی<sup>۱</sup>، آناسبیک لاله زاریان<sup>۲</sup>، علی رضا رحیمی<sup>۳</sup>، اکبر حسن زاده<sup>۴</sup>

- ۱-دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
- ۲-دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) [anasiklalazaryan@gmail.com](mailto:anasiklalazaryan@gmail.com)
- ۳-مربي، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
- ۴-مربي، آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.

نشریه پژوهش پرستاری دوره یازدهم، شماره ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵، ۷۶-۸۶

## چکیده

**مقدمه:** ویژگی‌های زمینه‌ای بیمار می‌تواند بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت وی تأثیرگذار باشد و رفتار اطلاع‌یابی سلامت مناسب نیز منجر به پیشگیری از بیماری‌ها یا بهبود روند درمان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی شهر اصفهان می‌باشد.

**روش:** نوع مطالعه کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ۶۴۲۴ نفر بیماران دیابتی تحت درمان در ۱۰ مرکز درمانی تحت نظرارت معاونت درمان استان اصفهان و حجم نمونه ۳۶۲ نفر بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه لانگو بوده است. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با کنترل متغیر سن، بین مدت زمان تشخیص بیماری با برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت رابطه مستقیم و معناداری ( $p < 0.05$ ) وجود دارد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد میانگین نمره برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی به صورت معناداری ( $p < 0.05$ ) در دیابت دوران بارداری بیشتر از دیابت نوع دو و پره دیابت است. آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت در افراد دارای سابقه ابتلا به دیابت در خانواده با افراد فاقد سابقه ابتلا به دیابت در خانواده، وجود دارد ( $p < 0.05$ ).

**نتیجه گیری:** بعضی از عوامل زمینه‌ای مانند مدت زمان تشخیص بیماری؛ نوع دیابت و وجود و سابقه دیابت در خانواده بر نحوه رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی تأثیرگذار است. لذا لازم است نظر به اهمیت سلامت مادر و جنین و همچنین بیماران پرهدیابتی تمهیدات لازم جهت دسترس پذیری آنان به اطلاعات مناسب در مورد بیماری و سهولت این دسترسی اقداماتی توسعه مسئولین سلامت کشور اندیشیده شود. از سوی دیگر می‌توان از طریق بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت سایر بیماران مزمن و نیازمندی از آنان می‌توان اطلاعات مورد نیازشان را به صورت بهینه و مؤثرتری به آنان منتقل کرد و به پیشگیری از عوارض چنین بیماری‌هایی آنان یا بهبود خود مراقبتی و فرآیند درمان آنان کمک کرد.

**کلید واژه‌ها:** دیابت، رفتار اطلاع‌یابی سلامت، عوامل زمینه‌ای، اصفهان، ایران.

## مقدمه

رفتار جستجوی اطلاعات سلامت بیانگر چگونگی جستجو، یافتن و به کار بردن اطلاعات مرتبط با بیماریها، اطلاعات مربوط به عوامل تهدیدکننده سلامت و فعالیتهای مرتبط با ارتقای سلامت توسط یک فرد می‌باشد (۱). از جمله مفاهیم مهم مرتبط با آن می‌توان موارد زیر را نام برد: (۱) نوع اطلاعات سلامت مشاهده شده؛ (۲) وسعت اطلاعات سلامت مشاهده شده (۲)؛ (۳) عوامل مرتبط با منبع اطلاعات، مانند اعتبار و صحت منبع؛ (۴) عوامل مرتبط با پیامهای موجود در منابع اطلاعاتی مانند میزان وضوح یا ابهام پیام؛ (۵) ویژگیهای فرد جستجوگر مانند درکی که وی از بیماری خود دارد (۳). از آنجایی که رفتار یک پدیده روانشناسی و متأثر از عوامل زمینه‌ای، محیطی و شخصی می‌باشد، چنین به نظر می‌رسد که ویژگیهای محیطی و شخصیتی بیمار بر رفتار جستجوی اطلاعات سلامت وی تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیمار نیز تعیین کننده نحوه جستجو و دریافت اطلاعات توسط او بوده و در نهایت بر بازدهی سلامت فرد و افزایش کیفیت زندگی وی اثرگذار است (۳).

یکی از مهمترین مسائلی که می‌تواند کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، بیماریهای مزمن می‌باشد. از جمله این بیماریها می‌توان به دیابت اشاره کرد که بالاترین سطح شیوع را در ایران به خود اختصاص داده است (۴). افراد مبتلا به دیابت با خطر بالای عوارض حاد و مزمن دیابت رو به رو هستند (۵). این بیماری فشارهای مادی و معنوی زیادی را بر بیمار و خانواده اش تحمیل می‌کند (۶).

سالانه بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مشکلات ناشی از بیماری دیابت می‌برند و دو برابر این تعداد نیز در خطر بروز حملات قلبی و سکته قرار دارند (۷). تخمین زده شده است که تعداد افراد مبتلا به دیابت در بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ از ۱۷۱ میلیون نفر به ۳۶۶ میلیون نفر افزایش خواهد یافت (۸). با توجه به این مطلب می‌توان گفت رشد بیماری دیابت در دنیای امروزی معادل ۲۴ درصد در سال است (۹). شیوع دیابت در کشور ما نیز سیر صعودی داشته است (۱۰-۱۳). بر اساس آمار ارائه شده در وب سایت بنیاد بینالمللی پیشگیری و کنترل دیابت، ۷/۸ درصد از جمعیت ۲۵ تا ۶۰ ساله کشور مبتلا به دیابت هستند و این در حالی است که نیمی از افراد مبتلا به دیابت از بیماری خود بی اطلاع می‌باشند (۱۴) و بسیاری از این بیماران با کشف عوارض دیررس آن نسبت به بیماری چندساله خود آگاه می‌شوند (۱۰-۱۳). در سال ۲۰۱۳ آمار بیماران دیابتی ایران ۵۵۰،۲۱۴۵ نفر بوده است و در این سال حدود ۳۸ هزار مرگ

ناشی از این بیماری در ایران گزارش شده است (۱۵). به همین علت حداقل حدود ۱۵ سال است که پیشگیری و کنترل دیابت رسماً جزو اولویتهای بهداشتی ایران قرار گرفته است (۱۶).

یکی از جنبه‌های مهم درمان دیابت خود مدیریتی آن است (۱۵) این فرایند منجر به افزایش کنترل آگاهانه بیماری، مدیریت فعالانه آن، عدم پیشرفت بیماری و به دنبال آن کاهش هزینه‌های ثانویه حاصل از درمان عوارض ناشی از دیابت می‌شود (۱۱). نکته قابل تأمل این است که با توجه به نقش مهم اطلاعات در مقابله با بیماری‌ها، کاهش استرس، پریشانی و عدم اطمینان، به دست آوردن کنترل و ارتقای خود مراقبتی (۱۷)، خود مدیریتی بیماری دیابت نیز تنها در صورت برخورداری از اطلاعات مناسب در زمان مناسب امکان‌پذیر است (۱۸-۱۹) دسترس پذیر ساختن این اطلاعات نیز نیازمند بررسی رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است.

از آنجایی که رفتار اطلاع‌یابی سلامت یک پدیده روانشناسی است، چنین به نظر می‌رسد که همچون سایر پدیده‌های روانشناسی متأثر از ویژگیهای زمینه‌ای، فردی و محیطی باشد. ویژگی‌های زمینه‌ای بیمار مبتلا به دیابت بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت وی در نتیجه بر بازدهی کنترل سلامت او تأثیرگذار است (۳). چنین عواملی نقش بسیار مهمی در تبیین تفاوت‌های موجود در عواملی چون دسترسی، جستجو و پردازش اطلاعات همچنین اقدام به عمل بر اساس اطلاعات کسب شده توسط گروه‌های موجود در جامعه دارد (۲۰). اهمیت این موضوع در حدی است که تاکنون پژوهش‌های بسیاری در خارج از ایران به بررسی عوامل زمینه‌ای گوناگون تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی بیماران پرداخته‌اند.

های<sup>۱</sup> و همکاران دریافتند شدت بیماری و میزان درد از عوامل مؤثر بر جستجوی آن لاین اطلاعات سلامت در بیماران مبتلا به روماتیسم بود، به طوری که افرادی که بیماری آنها شدیدتر بوده و درد بیشتری داشتند، بیشتر به جستجوی پیوسته اطلاعات سلامت می‌پرداختند و کمتر در مورد این اطلاعات بحث می‌کردند (۲۱). کافینگست<sup>۲</sup> و همکاران دریافتند افرادی که سابقه سرطان در پیشینه خانوادگی خود داشتند، بیشتر به جستجوی اطلاعات مرتبط با سرطان می‌پرداختند. همچنین به علت ژنتیکی بودن بیماری سرطان، نیاز به آموزش هایی در مورد میزان خطر ابتلا به سرطان در افراد دارای سابقه خانوادگی سرطان و آگاه کردن آنها از روش‌های پیشگیری از سرطان، احساس شد (۲۲). نگلر<sup>۳</sup> و همکاران دریافتند افراد مبتلا به

1- Hay

2-Kaphingst

3- Negler

تشخیص بیماری، نوع دیابت، استفاده از انسولین، استفاده از داروهای خوراکی، وجود بیماری‌های دیگر (علووه بر دیابت) و خود سابقه ابتلا به دیابت در خانواده.

#### روش مطالعه

نوع مطالعه کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ۶۴۲۶ بیمار دیابتی تحت درمان در ۱۰ مرکز درمانی (امیر حمزه، شهید رضائیان، حضرت سجاد (ع)، خوارسگان، رهنان، امام علی (ع)، قائدی، ملاصدرا، خدیجه کبری (س)، حاج عباس مهربد لadan) تحت نظرت معاونت درمان استان اصفهان بوده است (۶۴۲۶). نفر. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای غیرردیصی و با سطح اطمینان ۹۵ درصد حداقل ۳۶۲ نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه رفتار اطلاع‌یابی بیماران دیابتی لانگو (۳) مربوط به سال ۲۰۱۰ است که برای ایران بومی سازی شده است (۲۸-۲۹). بر اساس نظر متخصصانی که روایی محتوای پرسشنامه را انجام دادند، چندین سؤال غیر مرتبط با فرهنگ کشور ایران از پرسشنامه مذکور حذف شد. این سؤالات مربوط به تعدد زبانی، نژاد و مذهب بیماران دیابتی بود. پرسشنامه دارای چهار بعد و ۸۵ سؤال است. ۵۳ پرسش دارای طیف لیکرت، ۲۵ پرسش دارای پاسخ بلی خیر و ۷ پرسش گزینه‌ای هستند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده و آلفای کرونباخ بعد رفتار، شناخت و تعامل بین‌فردي (در جستجوی اطلاعات (سه مؤلفه رفتار، درک و تعامل بین‌فردي)) ۰/۷۹۸، بعد منابع اطلاعاتی (سه مؤلفه کسب اطلاعات از افراد، رسانه‌های سنتی و رسانه‌های جدید) ۰/۷۴۸، بعد دریافت اطلاعات (دو مؤلفه دریافت فعالانه و غیرفعالانه اطلاعات) ۰/۸۹۸ و بعد تأثیر اطلاعات بر بیمار (دو مؤلفه تأثیر اطلاعات سلامت بر بیماری از دیدگاه بیمار و استرس) ۰/۸۴۳ محاسبه شد.

روش گردآوری داده‌ها توزیع و جمع‌آوری حضوری پرسشنامه‌ها در بین بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز نامبرده و تعهد به محترمانه بودن اطلاعات بوده است. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تی مستقل) از طریق نرم افزار SPSS ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

1-Longo

2-McLallen

3-Nordfeldt

4-Behavior, cognitive ability and interpersonal communication

سرطان روده، نسبت به افرادی که مبتلا به سرطان سینه و پروستات بودند، کمتر به جستجوی اطلاعات می‌پرداختند. البته این تفاوتها تنها در مراحل اولیه بیماری قابل مشاهده بود و در مراحل پیش رفته بیماری تفاوت چندانی در شیوه جستجوی اطلاعات میان این گروهها مشاهده نشد. نتایج نشان داد ارائه دهنده کان مراقبت سلامت و پزشکان نه تنها باید در مورد نیازهای اطلاعاتی بیماران از آنها سؤالاتی را می‌پرسیدند، بلکه باید در مورد چگونگی انتخاب منابع اطلاعاتی، عوامل تأثیرگذار بر این انتخاب و نیز شیوه بهره‌گیری از این اطلاعات در بیماران نیز مطلع می‌بودند (۲۳). لانگو<sup>۱</sup> و همکاران دریافتند بیماران مبتلا به دیابت بر اساس سیر پیشرفت بیماری خود به دنبال اطلاعات می‌رفتند و روابط شخصی بیماران در درک و استفاده از اطلاعات مؤثر بود. اما در نهایت برای درک و بهره‌گیری از اطلاعات پیچیده و ناسازگار، کمک متخصصان سلامت احساس می‌شد و سواد سلامت بیماران در توانایی آنان نسبت به درک و بهره‌گیری از اطلاعات تفاوت ایجاد می‌کرد (۳). مک لان<sup>۲</sup> و همکاران دریافتند افرادی که بیماری سرطان آنها در فاز ۳ و ۴ بود نسبت به افرادی که در مرحله اولیه بیماری خود بودند، بیشتر به جستجوی اطلاعات می‌پرداختند (۲۴). نورفلت<sup>۳</sup> و همکاران دریافتند انتخاب منابع اطلاعاتی توسط والدین تحت تأثیر موقعیت زندگی آنان، تجارت کسب شده در گذشته، خط سیر بیماری، مراحل رشد فرزندان خود، دانش و مهمنت از همه میزان اعتماد آنها نسبت به منابع اطلاعاتی بوده است. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد متولیان امور سلامت و طراحان سیستم‌های اطلاعاتی باید نیازهای گوناگون کودکان را که نشأت گرفته از شرایط زندگی، رشد سنی و خط سیر بیماری آنان است را در نظر بگیرند (۲۵).

بررسی پیشینه‌ها نشان داد در ایران مطالعات چندانی بر روی عوامل زمینه‌ای تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران انجام نشده است، اما در خارج از کشور اهمیت بسیاری به چنین مطالعاتی داده شده است. ضرورت انجام پژوهش حاضر، روند رو به گسترش دیابت در جهان، ایران و شهر اصفهان (۱۰، ۱۲، ۲۶)، همچنین غیرقابل انکار بودن تأثیر اطلاعات بر بهبود روند درمان و خود- مدیریتی بیماران مبتلا به دیابت می‌باشد (۲۷، ۵). با بررسی ارتباط میان عوامل زمینه‌ای و رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی می‌توان راهکارهایی جهت انتقال هر چه مؤثرتر اطلاعات به این بیماران و در نتیجه آن بهبود خود مراقبتی و روند درمان آنان شناسایی کرد. به این ترتیب، پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر عوامل زمینه‌ای بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. عوامل زمینه‌ای مورد بررسی عبارتند از مدت زمان

عوامل زمینه‌ای مدت زمان تشخیص بیماری، نوع دیابت، استفاده از انسولین و داروهای خوراکی، وجود بیماری غیر از دیابت و سابقه دیابت در خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

جدول یک ارتباط بین مدت زمان تشخیص بیماری دیابت با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بدون کنترل سن، ارتباط معناداری بین مدت زمان تشخیص بیماری و مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت مشاهده نمی‌شود، اما در صورت کنترل کردن متغیر سن، مشاهده می‌شود که بین مدت زمان تشخیص بیماری با برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت شامل دریافت غیرفعالانه اطلاعات ( $p=0.01$ ) و ( $p=0.01$ ) رفتار در جستجوی اطلاعات ( $p=0.01$ ) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین مدت زمان تشخیص بیماری با سایر مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی رابطه معناداری وجود ندارد.

#### یافته‌ها

جمعیت آماری ۶۴۲۶ نفر و حجم نمونه ۳۶۲ نفر با نزدیکی ۱۰۰ درصد پرسشنامه‌ها (به دلیل جمع‌آوری حضوری پرسشنامه‌ها) بوده است. از نظر جنسیت، خانمها  $\frac{1}{3}$  درصد و آقایان  $\frac{2}{3}$  درصد در پژوهش مشارکت داشته‌اند. از این تعداد  $\frac{99}{100}$  درصد متاهل و  $\frac{6}{100}$  درصد مجرد بوده اند. سهم دارندگان مدرک فوق لیسانس  $\frac{76}{100}$ ، لیسانس  $\frac{1}{10}$ ، فوق دیپلم  $\frac{1}{4}$ ، دیپلم  $\frac{10}{100}$  و زیر دیپلم  $\frac{2}{100}$  درصد بوده است. دامنه سنی آزمودنی‌ها  $20-82$  با میانگین  $58.37$  و انحراف معیار  $11.30$  بوده است. بیکاری، شغل آزاد، کارمند، کارگر، بازنشسته و سایر مشاغل به ترتیب  $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{1}{10}$ ،  $\frac{8}{10}$ ،  $\frac{20}{100}$  و  $\frac{63}{100}$  درصد گزارش شد. درآمد  $\frac{81}{100}$  درصد پاسخگویان کمتر از یک میلیون تومان،  $\frac{18}{100}$  درصد پاسخگویان بین دو تا سه میلیون تومان گزارش شد. رفتار اطلاع‌یابی سلامت بر اساس پرسشنامه در ده مؤلفه از چهار بعد مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط این ابعاد و مؤلفه‌ها با

**جدول ۱:** رابطه مدت زمان تشخیص بیماری با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی

مدت زمان تشخیص بیماری همراه با کنترل سن		مدت زمان کنترل سن		مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت	ابعاد رفتار اطلاع‌یابی سلامت
p-value	r	p-value	r		
$0.107$	$-0.09$	$0.917$	$-0.006$	دریافت فعالانه اطلاعات دریافت غیرفعالانه اطلاعات	دریافت اطلاعات
	$-0.10$	$-0.261$	$-0.06$		
$0.263$	$-0.06$	$0.936$	$-0.04$	کسب اطلاعات از افراد کسب اطلاعات از رسانه‌های سنتی کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید	منابع اطلاعاتی
	$-0.05$	$-0.298$	$-0.06$		
$0.909$	$-0.006$	$-0.138$	$-0.08$		
$0.01$	$-0.14$	$-0.474$	$-0.04$	رفتار در جستجوی اطلاعات درک در جستجوی اطلاعات تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین‌فردی در جستجوی اطلاعات
	$-0.115$	$-0.08$	$-0.225$		
	$-0.196$	$-0.07$	$-0.976$		
$0.877$	$-0.008$	$-0.503$	$-0.04$	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار استرس	تأثیر اطلاعات بر بیمار
	$-0.196$	$-0.07$	$-0.07$		

این مؤلفه در دیابت بارداری به طور معنی داری بیشتر از دو گروه قبلی است ( $p<0.05$ ). همچنین آزمون تعقیبی دانکن نشان داد که بیماران پره دیابتی و نوع دوم از نظر کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید با یکدیگر تفاوتی ندارند، اما میانگین نمره این مؤلفه در دیابت بارداری به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر است ( $p<0.05$ ). همچنین این آزمون در مورد تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار نیز نشان داد که بیماران پره دیابتی و نوع دوم از این نظر با هم تفاوتی ندارند. بیماران پرهدیابتی و دیابت دوران بارداری نیز با هم تفاوتی ندارند، اما میانگین نمره این مؤلفه در دیابت نوع دو و دیابت دوران بارداری به طور معناداری با یکدیگر تفاوت دارد ( $p<0.05$ ).

جدول ۲ رابطه بین انواع دیابت با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی را نشان می‌دهد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد میانگین نمره برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی شامل کسب اطلاعات از افراد ( $p=0.12$ )، کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید ( $p=0.009$ ) و تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار ( $p=0.027$ ) به صورت معنی داری در دیابت دوران بارداری بیشتر از دیابت نوع دو و پره دیابت است. اما بین سایر مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی با انواع دیابت تفاوت معناداری مشاهده نشد. آزمون تعقیبی دانکن نیز نشان داد که بیماران پره دیابتی و نوع دوم از نظر کسب اطلاعات از افراد با یکدیگر تفاوتی ندارند، اما میانگین نمره

جدول ۲: رابطه نوع دیابت با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی

p-value	آنواع دیابت P-value						مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت	ابعاد رفتار اطلاع‌یابی سلامت		
	دیابت دوران بارداری		پره دیابت		دیابت نوع دو					
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین				
۰/۴۴۳ ۰/۶۰۲	۱۰/۵۷ ۱۱/۱۶	۴۴/۰۵ ۴۴/۸۴	۱۳/۳۵ ۱۴/۶۵	۳۸/۲۳ ۴۰/۵۱	۱۱/۷۱ ۱۳/۱۰	۳۹/۳۳ ۴۱/۹۰	دریافت فعالانه اطلاعات دریافت غیرفعالانه اطلاعات	دریافت اطلاعات		
۰/۰۱۲ ۰/۱۱۴ ۰/۰۰۹	۸/۹۱ ۱۲/۳۲ ۲۶/۷۳	۳۱/۷۵ ۲۸/۵۷ ۲۸/۵۷	۸/۸۱ ۱۱/۱۱ ۲۲/۰۸	۲۱/۸۸ ۱۸/۰۲ ۹/۳۸	۹/۷۵ ۱۳/۱۹ ۱۷/۳۵	۲۴/۵۰ ۱۹/۱۹ ۷/۱۷	کسب اطلاعات از افراد کسب اطلاعات از رسانه‌های سنتی کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید	منابع اطلاعاتی		
۰/۴۸۸ ۰/۲۹۱ ۰/۱۴۳	۱۴/۶۴ ۸/۷۳ ۱۰/۲۹	۵۴/۰۸ ۵۸/۹۳ ۴۳/۵۷	۹/۰۲ ۱۳/۷۰ ۱۱/۹۰	۵۰/۷۹ ۵۱/۴۸ ۴۱/۶۷	۱۰/۲۸ ۱۱/۵۷ ۱۲/۹۰	۵۲/۲۱ ۵۲/۲۹ ۴۵/۸۵	رفتار در جستجوی اطلاعات درک در جستجوی اطلاعات تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات		
۰/۰۲۷ ۰/۲۶۷	۱۱/۸۳ ۲۳/۵۰	۸۰/۹۵ ۷۰/۲۴	۱۱/۹۸ ۱۸/۲۶	۷۵/۴۶ ۶۹/۱۰	۹/۶۸ ۱۹/۷۴	۷۲/۹۱ ۶۵/۱۷	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار استرس	تأثیر اطلاعات بر بیمار		

جدول ۳ ارتباط بین استفاده از انسولین و رفتار اطلاع‌یابی سلامت در بیماران دیابتی مورد بررسی را نشان می‌دهد. آزمون تی مستقل نشان داد هیچگونه تفاوت معناداری بین میانگین نمره مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت افرادی که از انسولین استفاده می‌کنند و افرادی که از انسولین استفاده نمی‌کنند، وجود ندارد ( $P > 0.05$ ).

جدول ۳: رابطه استفاده از انسولین با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی

P-value	استفاده از انسولین				مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت	ابعاد رفتار اطلاع‌یابی سلامت		
	خبر		بله					
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین				
۰/۹۱۶	۱۱/۶۲	۳۹/۱۷	۱۳/۹۹	۳۹/۳۵	دریافت فعالانه اطلاعات	دریافت اطلاعات		
۰/۰۵۷	۱۲/۹۹	۴۱/۴۷	۱۵/۲۶	۴۲/۷۳	دریافت غیرفعالانه اطلاعات			
۰/۲۸۹	۹/۱۳	۲۳/۸۸	۱۱/۹۷	۲۵/۳۳	کسب اطلاعات از افراد			
۰/۰۹۰	۱۲/۲۷	۱۸/۶۳	۱۵/۲۲	۲۱/۷۱	کسب اطلاعات از رسانه‌های سنتی	منابع اطلاعاتی		
۰/۸۸۹	۱۹/۱۱	۷/۹۶	۱۷/۰۲	۸/۳۳	کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید			
۰/۴۸۸	۱۰/۱۸	۵۱/۸۰	۹/۸۹	۵۲/۸۰	رفتار در جستجوی اطلاعات			
۰/۶۹۴	۱۱/۷۳	۵۲/۱۵	۱۳/۳۴	۵۲/۸۱	درک در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات		
۰/۰۳۹	۱۲/۷۹	۴۵/۰۳	۱۲/۷۴	۴۴/۶۷	تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات			
۰/۸۵۲	۹/۸۸	۷۳/۵۲	۱۲/۲۲	۷۳/۸۰	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار	تأثیر اطلاعات بر بیمار		
۰/۶۵۰	۱۹/۵۹	۶۶/۲۵	۱۹/۴۶	۶۵	استرس			

جدول ۴ ارتباط بین استفاده از قرص‌های خوارکی و رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی را نشان می‌دهد. آزمون تی مستقل نشان داد هیچگونه تفاوت معناداری بین میانگین نمره مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت در افرادی که از داروهای خوارکی استفاده می‌کنند با افرادی که از داروهای خوارکی استفاده نمی‌کنند، وجود ندارد ( $P > 0.05$ ).

جدول ۴: رابطه مصرف داروهای خوارکی با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی

P-value	صرف داروهای خوارکی					مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت	ابعاد رفتار اطلاع‌یابی سلامت		
	خیر		بله						
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین					
.0/۵۴۳	۱۶/۰۳	۴۰/۱۲	۱۱/۲۰۵۴۸	۳۹/۰۴	دربافت فعالانه اطلاعات	دربافت اطلاعات	دربافت اطلاعات		
.0/۵۲۷	۱۶/۹۷	۴۲/۷۵	۱۲/۶۶۶۰۸	۴۱/۵۰	دربافت غیرفعالانه اطلاعات				
.0/۸۲۹	۱۱/۹۲	۲۴/۳۸	۹/۲۲۲۰۴	۲۴/۰۸	کسب اطلاعات از افراد	منابع اطلاعاتی	منابع اطلاعاتی		
.0/۸۰۹	۱۲/۸۲	۱۸/۷۵	۱۲/۸۵۱۳۳	۱۹/۲۱	کسب اطلاعات از رسانه‌های سنتی				
.0/۴۷۲	۲۰/۹۸	۹/۷۲	۱۸/۳۶۶۴۶	۷/۷۳	کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید				
.0/۹۶۹	۱۰/۴۲	۵۱/۹۲	۱۰/۰۹	۵۱/۹۸	رفتار در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات		
.0/۷۲۹	۱۳/۴۵	۵۲/۷۸	۱۱/۷۴	۵۲/۱۶	درک در جستجوی اطلاعات				
.0/۸۴۹	۱۴/۰۹	۴۵/۲۸	۱۲/۵۲	۴۴/۹۲	تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات				
.0/۳۸۶	۱۴/۴۶	۷۴/۶۹	۹/۳۸۶۵۷	۷۳/۳۷	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار استرس	تأثیر اطلاعات بر بیمار	تأثیر اطلاعات بر بیمار		
.0/۴۵۲	۱۸/۰۷	۶۴/۲۰	۱۹/۸۰	۶۶/۳۷					

جدول ۵ ارتباط بین ابتلا به بیماری‌های دیگری غیر از دیابت با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی آزمون تی مستقل نشان داد که هیچ گونه تفاوت معناداری بین میانگین نمره مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت در افراد دارای بیماری‌های دیگر و افراد فاقد بیماری‌های دیگر وجود ندارد ( $P > 0.05$ ).

جدول ۵: رابطه وجود بیماری‌های دیگر با رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی مورد بررسی

P-value	مبتلا بودن به بیماری‌های غیر از دیابت					مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت	ابعاد رفتار اطلاع‌یابی سلامت		
	خیر		بله						
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین					
.0/۵۴۰	۱۱/۹۷	۳۸/۸۱	۱۲/۱۰	۳۹/۵۹	دربافت فعال اطلاعات	دربافت اطلاعات	دربافت اطلاعات		
.0/۳۰۶	۱۳/۲۳	۴۰/۹۶	۱۳/۵۱	۴۲/۴۰	دربافت غیرفعال اطلاعات				
.0/۰۶۱	۸/۶۹	۲۳/۱۶	۱۰/۴۵	۲۵/۰۶	کسب اطلاعات از افراد	منابع اطلاعاتی	منابع اطلاعاتی		
.0/۷۴۴	۱۲/۳۷	۱۸/۹۲	۱۳/۳۰	۱۹/۳۶	کسب اطلاعات از رسانه‌های سنتی				
.0/۰۷۵	۱۹/۷۴	۹/۷۹	۱۷/۶۲	۶/۲۸	کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید				
.0/۳۱۵	۹/۴۶	۵۱/۴۳	۱۰/۷۵	۵۲/۵۰	رفتار در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات		
.0/۲۲۸	۱۱/۳۰	۵۳/۰۲	۱۲/۶۱	۵۱/۵۰	درک در جستجوی اطلاعات				
.0/۵۹۳	۱۲/۶۰	۴۴/۶۱	۱۲/۹۱	۴۵/۳۳	تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات				
.0/۶۳۶	۱۰/۳۹	۷۳/۸۳	۱۰/۲۰	۷۳/۳۲	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار استرس	تأثیر اطلاعات بر بیمار	تأثیر اطلاعات بر بیمار		
.0/۲۷۶	۱۹/۲۴	۶۷/۱۸	۱۹/۸۳	۶۴/۹۴					

جدول ۶ رابطه سابقه دیابت در خانواده بیماران دیابتی مورد بررسی را با رفتار اطلاع‌یابی سلامت آنان نشان می‌دهد. آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت در افراد دارای سابقه ابتلا به دیابت در خانواده با افراد فاقد سابقه ابتلا به دیابت در خانواده، وجود دارد ( $P < 0.05$ ). میانگین نمره مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت شامل دریافت فعالانه اطلاعات ( $P = 0.16$ ) و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات ( $P < 0.001$ ) در افراد دارای سابقه ابتلا به دیابت در خانواده، به صورت معناداری بیشتر از میانگین نمره مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی در افراد فاقد سابقه ابتلا به دیابت در خانواده بود. بین دیگر مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت در دو گروه مذکور تفاوت معنی داری مشاهده نشد ( $P > 0.05$ ).

## جدول ۶: رابطه سابقه دیابت در خانواده بیماران دیابتی مورد بررسی با رفتار اطلاع‌یابی سلامت پاسخگویان

P-value	سابقه ابتلا به دیابت در خانواده				مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی سلامت	ابعاد رفتار اطلاع‌یابی سلامت		
	خبر		بله					
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین				
۰/۰۱۶	۱۰/۸۴	۳۷/۹۵	۱۲/۳۹	۴۱/۰۳	دریافت فعالانه اطلاعات	دریافت اطلاعات		
۰/۰۶۲	۱۲/۴۳	۴۰/۵۹	۱۴/۵۳	۴۳/۲۶	دریافت غیرفعالانه اطلاعات			
۰/۰۸۶	۹/۱۱	۲۳/۴۰	۱۰/۳۳	۲۵/۱۷	کسب اطلاعات از افراد	منابع اطلاعاتی		
۰/۱۳۴	۱۲/۴۱	۱۸/۳۰	۱۳/۳۷	۲۰/۳۵	کسب اطلاعات از رسانه‌های سنتی			
۰/۱۷۷	۱۷/۳۳	۶/۹۲	۲۰/۶۲	۹/۶۳	کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید			
۰/۶۲۰	۹/۴۵	۷۳/۳۵	۱۱/۴۱	۷۳/۹۰	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار استرس	تأثیر اطلاعات بر بیمار		
۰/۹۲۸	۱۹/۰۲	۶۶/۱۲	۲۰/۳۴	۶۵/۹۳				
۰/۰۸۷	۹/۸۶	۵۱/۲۱	۱۰/۴۴	۵۳/۰۶	رفتار در جستجوی اطلاعات	رفتار، درک و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات		
۰/۳۰۶	۱۱/۶۸	۵۲/۷۹	۱۲/۴۲	۵۱/۴۸	درک در جستجوی اطلاعات			
<۰/۰۰۱	۱۰/۳۳	۴۲/۹۸	۱۵/۱۸	۴۷/۸۷	تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات			
۰/۶۲۰	۹/۴۵	۷۳/۳۵	۱۱/۴۱	۷۳/۹۰	تأثیر اطلاعات از دیدگاه بیمار استرس	تأثیر اطلاعات بر بیمار		
۰/۹۲۸	۱۹/۰۲	۶۶/۱۲	۲۰/۳۴	۶۵/۹۳				

دیدگاه بیمار در بیماران دارای دیابت دوران بارداری نسبت به افراد دارای دیابت نوع دو و پره دیابت متفاوت بود. احتمال می‌رود دلیل این تفاوت این باشد که مادران باردار علاوه بر نگرانی در مورد خود، در مورد وضعیت سلامت جنین خود نیز بسیار نگران می‌باشند و از آنجایی که جستجوی اطلاعات به عنوان نوعی از سبکهای مقابله محسوب می‌شود، به همین منظور زنان باردار به منظور مقابله با چنین شرایطی و پیشگیری کردن از عوارض نامطلوب دیابت بر روی جنین خود، نسبت به افرادی که مبتلا به دیابت نوع دو و پره دیابت هستند، بیشتر به جستجو و کسب اطلاعات از افراد و رسانه‌های جدید می‌پردازند چرا که معتقدند این اطلاعات بر سلامت آنان و جنینشان تأثیر مثبت دارد. از طرفی میانگین نمره رفتار اطلاع‌یابی در بیماران دارای دیابت نوع دو بیشتر از پره دیابت بود. این امر نشان‌دهنده بیشتر بودن فعالیت‌های مرتبط با جستجوی اطلاعات در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نسبت به پره دیابت می‌باشد. احتمال می‌رود دلیل این اختلاف این باشد که افراد پره دیابتی نسبت به افراد مبتلا به دیابت نوع دو که دارای سابقه بیماری بیشتری هستند، بیماری خود را کمتر جدی تلقی می‌کنند و در نتیجه کمتر به جستجوی اطلاعات می‌پردازند. از آن جایی که دیابت از دسته بیماریهایی است که دارای عوارض دیررس می‌باشد و معمولاً در اوایل بیماری فرد احساس درد یا ناخوشی ندارد، در صورتی که اطلاعات کافی در مورد این بیماری و عوارض جبران ناپذیر آن نداشته باشد، احساس خطر نمی‌کند و در نتیجه ضرورتی احساس نمی‌کند که به منظور مقابله با شرایط

## نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین رفتار اطلاع‌یابی با برخی از متغیرهای زمینه‌ای مانند استفاده یا عدم استفاده از انسولین و داروهای خوارکی، هم چنین ابتلا به انواع دیگری از بیماریها به جز دیابت ارتباط معناداری وجود نداشت. اما بین رفتار اطلاع‌یابی با برخی دیگر از متغیرهای زمینه‌ای شامل مدت زمان تشخیص بیماری، نوع دیابت و سابقه ابتلا به دیابت در افراد خانواده ارتباط معناداری وجود داشت که به شرح ذیل می‌باشد.

سن بر روی برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی شامل دریافت غیرفعالانه اطلاعات و رفتار در جستجوی اطلاعات تأثیر مستقیم وجود دارد اما بر روی سایر مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی تأثیری ندارد. با کنترل سن، هر چه از زمان تشخیص بیماری بیماران دیابتی بیشتر بگذرد، میزان دریافت غیرفعالانه اطلاعات توسعه آنان بیشتر شده و از اطلاعات کسب شده به این طریق بیشتر استفاده می‌کنند. نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش‌های نگلر و همکاران (۲۳)، لانگو و همکاران (۳)، مک لان و همکاران (۲۴)، های و همکاران (۲۱) و نوردللت و همکاران (۲۵) است که در آن سیر پیشرفت بیماری عاملی تأثیرگذار در روند رفتار جستجوی اطلاعات بیماران بوده است و با پیشرفت بیماری، بیماران و یا اطرافیان آنان بیشتر به جستجوی اطلاعات می‌پرداختند.

برخی از مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی شامل کسب اطلاعات از افراد، کسب اطلاعات از رسانه‌های جدید و تأثیر اطلاعات از

پژوهش به عنوان پایه ای برای پژوهش‌های آتی به شمار رود و به کشف و شناسایی زمینه‌های تحقیقاتی جدیدتر و مؤثرتری در این زمینه منجر شده و موجب افزایش سطح سلامت جامعه بیماران دیابتی شود. بدین منظور پیشنهادات زیر ارائه می‌شوند.

از آنجایی که با گذشت زمان بیماران دیابتی کمتر به جستجوی فعالانه اطلاعات مرتبط با بیماری خود می‌بردازند، لازم است تمھیداتی جهت اطلاع‌رسانی به موقع، مؤثر و دائمی توسط تیم درمان و رسانه‌های گروهی به افراد دارای سابقه طولانی ابتلا به دیابت جهت آگاه نگه داشتن آنان نسبت به اهمیت خود- مدیریتی این بیماری اندیشه شود.

از آنجایی که افراد دارای دیابت بارداری اغلب از افراد دیگر و رسانه‌های جدید به کسب اطلاعات سلامت می‌بردازند، لازم است افراد مطلع و محتوا اطلاعاتی معتبر، صحیح و دقیق در رسانه‌های جدیدی چون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با سهولت در دسترس آنان قرار داده شود.

از آنجایی که بیماران پره دیابتی نسبت به سایر بیماران دیابتی کمتر به جستجوی اطلاعات سلامت مرتبط می‌بردازند لازم است به دلیل اهمیت پیشگیری و کنترل در مرحله پیش دیابت، اطلاعات موثق، معتبر و به موقع توسط تیم درمان، رسانه‌ها و سایر مجراهای اطلاعاتی چون اطلاع‌رسانان پزشکی در اختیار این افراد گذاشته شود تا از ابتلاء آنان به دیابت نوع دو جلوگیری شود.

از آنجایی که افراد دارای سابقه ابتلا به دیابت در خانواده بیشتر به جستجوی اطلاعات سلامت مرتبط می‌بردازند، به نظر می‌رسد انتقال مستقیم و غیر مستقیم تجارب چنین افرادی به سایر بیماران (البته پس از اعتبارستجوی و تأیید صحت و سندیت این تجارب توسط تیم درمان) مفید واقع شود.

#### تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی است که هنوزینه انجام آن توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأمین شده است.

موجود و یا پیشگیری از عوارض دیررس این بیماری، به جستجوی اطلاعات پردازد. نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش‌های نگلر و همکاران (۲۳)، مک لاکن و همکاران (۲۴) در مورد پیشرفت بیماری بیماری سلطان، لاتگو و همکاران (۳) در مورد پیشرفت بیماری دیابت، های و همکاران (۲۱) در مورد شدت بیماری و میزان درد در روماتیسم و نوردفلت و همکاران (۲۵) در مورد پیشرفت بیماری نوع یک در نوجوانان است که در این مطالعات سیر پیشرفت بیماری عاملی تأثیرگذار در روند رفتار جستجوی اطلاعات بیماران بوده است و با پیشرفت بیماری، بیماران و یا اطرافیان آنان بیشتر به جستجوی اطلاعات می‌پرداختند.

بین نحوه رفتار اطلاع‌یابی سلامت در برخی از مؤلفه‌ها شامل دریافت فعالانه اطلاعات و تعامل بین فردی در جستجوی اطلاعات در افراد دارای سابقه ابتلا به دیابت در خانواده با افراد فاقد سابقه ابتلا به دیابت در خانواده تفاوت وجود داشت، اما بین سایر مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی در دو گروه مذکور تفاوتی مشاهده نشد. دلیل این تفاوت ممکن است این باشد که افراد دارای سابقه ابتلا به دیابت در خانواده خود، شاهد عینی عوارض دیررس این بیماری در افراد خانواده بوده اند و طبیعتاً آشنایی بیشتری را نیز با این بیماری و عوارض آن دارند. در نتیجه به منظور پیشگیری، کنترل بیماری خود و یا جلوگیری از پیشروی آن، بیشتر در جستجوی اطلاعات مرتبط بوده اند. نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش کافنگیست است که در آن افرادی که سابقه سلطان در پیشینه خانوادگی خود داشتند، بیشتر به جستجوی اطلاعات مرتبط با سلطان می‌پرداختند (۲۶).

یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از ابتلا به دیابت و یا جلوگیری از پیشروی این بیماری و بروز عوارض آن خود- مدیریتی صحیح بیماری می‌باشد. اما باستی به این نکته توجه کرد که بدون دسترس پذیر ساختن اطلاعات سلامت مرتبط برای بیماران دیابتی، نمی‌توان از آنان انتظار خود- مدیریتی صحیح این بیماری را داشت. با در نظر گرفتن تأثیر مستقیم و انکاران پذیر اطلاعات سلامت بر دیدگاه بیمار نسبت به بیماری دیابت و در نتیجه از بین رفتن تصورات نادرست و اغلب نالمیدکننده مرتبط با بیماری، بیمار با انگیزه و انرژی بیشتری به بهبود وضعیت سلامت خود می‌اندیشد و اقداماتی را در این راستا به انجام می‌رساند که خود- مدیریتی صحیح بیماری یکی از مؤثرترین این اقدامات محسوب می‌شود. شناسایی عوامل گوناگون مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی و برنامه‌ریزی جهت انتقال صحیح و به وقت اطلاعات به آنان می‌تواند گامی در محقق ساختن خود- مدیریتی این بیماری باشد. انتظار می‌رود نتایج این

## References

1. Lambert S, Loiselle C. Health Information Seeking Behavior. Qual Health Res 2007;17(8):1006-19.
2. Allen S. Development And Validation Of A Suvey Instrument To Assess Health Information Seeking Behaviors Among African American Young Professionals [Ph.D. Thesis]. Alabama: University of Alabama; 2013.
3. Longo DR, Schubert SL, Wright BA, LeMaster J, Williams CD, Clore JN. Health Information Seeking, Receipt, and Use in Diabetes Self-management. Ann Fam Med 2010;8(4):334-40.
4. Masaeli N, Attari A, Molavi H, Najafi M, Siavash M. Normative data and psychometric properties of the quality of life questionnaire for patients with diabetes mellitus. koomesh. 2010; 11 (4) :263-269
5. Rahimian Boogar E, Besharat MA, Mohajeri Tehrani M, Talepasand S. [Predictive Role of Self-Efficacy, Belief of Treatment Effectiveness and Social Support in Diabetes Mellitus Self- Management]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2011;17(3):233-40. [Persian]
6. Shaw RJ, Johnson CM. Health Information Seeking and Social Media Use on the Internet among People with Diabetes. Online J Public Health Inform 2011;3(1):1-9
7. Shamsi M, Sharifirad Gh, Kachuyi A, Hassanzadeh A, Dejam S. [Knowledge, attitude and practice of female patients with type 2 diabetes regarding the Walkway]. Payesh 2011;10(4):477-484. [Persian]
8. Tol A, Sharifirad Gh, Eslami A, Eslami A, Alhani F, Mohajeritehrani M, Shojaieezadeh D. [Self-Efficacy: An Efficient Functional Concept in Type 2 Diabetes Control]. Journal of Health System Research 2012; 8(2): 339-346. [Persian]
9. Bakhti M, Salehi M, Ashrafi M, Noushin D, Siavoush M. [Identification, Prevention, Control and Treatment of Diabetes]. Isfahan: Kyarad; 2010. [Persian]
10. Delavari A, Mahdavihezave A, Nouroozinejad A, Yarahmadi Sh. [Laboratory technician and Diabetes]. Tehran: Sound Publishing Center; 2004. [Persian]
11. Delavari A, Mahdavihezave A, Nouroozinejad A, Yarahmadi Sh. [National Diabetes Control and Prevention Program]. Tehran: Sound Publishing Center; 2004. [Persian]
12. Iran Diabetes Society. Diabetes; World Threatening Diseases. [Serial Online] 2013 [Cited 2013 May12]; [1Screen]
 

Available from: <http://www.ir-diabetes-society.com/Diabet-imp-1391.htm>. [Persian]
13. Weaver JB, Mays D, Weaver SS, Hopkins GL, Eroglu D, Bernhardt JM. Health Information-seeking Behaviors, Health Indicators, and Health Risks. Am J Public Health 2010;100(8):1520-5.
14. International Foundation for the Prevention and Control of Diabetes. Diabet and Statistic. [Serial Online] 2013 [Cited 2013 Dec 15]; [1Screen] Available from: <http://www.idpcf.com/Default.aspx?PageId=3a ZmYag 4>. [Persian]
15. Ministry of Health and Medical Education. Exclusive News. [Serial Online] 2014 [Cited 2013 Jun 2]; [1Screen] Available from: <http://behdasht.gov.ir/index.aspx?sited=1&pagied=32628&newsview=97743>. [Persian]
16. Abazari P, Amini M, Amini P, Sabouhi F, Yazdannik A. [Diabetes Nurse Educator Course: from

- Develop Perform]. Iranian Journal of Education in Medical Science 2011;10(5):918-27. [Persian]
17. Akhu-Zaheya LM. Factors Influencing Health Information-seeking Behavior of Jordanian Patients with Cancer [Ph.D. Thesis]..Buffalo: University of New York; 2007.
  18. Mohebi S, Sharifirad G, Feizi A, Botlani S, Hozori M, Azadbakht L. Can Health Promotion Model Constructs Predict Nutritional Behavior among Diabetic Patients. J Res Med Sci 2013;18(4):346-59.
  19. Keyvanara M, Hosseini S, Emami P. Social Support and Diabetes Control: a Study among Patients Admitted to Specialized Clinic of Dr. Gharazi Hospital in Isfahan. Med Arh 2012;66(1):24-7.
  20. Wang M, Viswanath K, Lam TH, Wang X, Chan SS. Social Determinants of Health Information Seeking among Chinese Adults in Hong Kong. PLoS One 2013;8(8):e73049.
  21. Hay MC, Cadigan RJ, Khanna D, Strathmann C, Lieber E, Altman R, et al. Prepared Patients: Internet Information Seeking by New Rheumatology Patients. Arthritis Rheum 2008;59(4):575-82.
  22. Kaphingst KA, Lachance CR, Condit CM. Beliefs about Heritability of Cancer and Health Information Seeking and Preventive Behaviors. J Cancer Educ 2009;24(4):351-56.
  23. Nagler RH, Gray SW, Romantan A, Kelly BJ, DeMichele A, Armstrong K, et al. Differences in Information Seeking among Breast, Prostate, and Colorectal Cancer Patients: Results from a Population-based Survey. Patient Educ Couns 2010;81 Suppl:S54-S62.
  24. Smith-McLallen A, Fishbein M, Hornik RC. Psychosocial Determinants of Cancer-related Information Seeking among Cancer Patients. J Health Commun 2011;16(2):212-25.
  25. Nordfeldt S, Angarne-Lindberg T, Nordwall M, Krevers B. Parents of Adolescents with Type 1 Diabetes - Their Views on Information and Communication Needs and Internet Use a Qualitative Study. PLoS One 2013;8(4):e62096.
  26. Alavinia M, Ghotbi M, Mahdavi Hezave A, Kermanchi J, Nasli Esfahani A, Yarahmadi S. [National Program for Prevention and Control of Diabetes Type II: Implementation in Urban Areas]. Tehran: Sepidbarg; 2012. [Persian]
  27. Yarahmadi A, Zare- Farashbandi F, Kachaei A, Nouri R, Hassanzadeh A. The Effects of Non-attendance Information Therapy on the Control of Glycosylated Hemoglobin (HbA1C) in Type 2 Diabetic Patients. Journal of Education and Health Promotion [Serial Online] 2014 [Cited 2013 Dec 2]; 3(1): [5 Screen]. Available from: URL: [http://www.jehp.net/temp/JEduHealthPromot3190-5134343\\_141543.pdf](http://www.jehp.net/temp/JEduHealthPromot3190-5134343_141543.pdf)
  28. Zare- Farashbandi F, Lalazaryan A, Rahimi A, Hassanzadeh A. How Health Information is received by Diabetic Patients?. Adv Bio Res 2015 (in press)
  29. Lalazaryan A. [The Study of Health Information Seeking Behavior of Isfahan Diabetic Patients based on long's model in 2014] [M.S Thesis]. Isfahan: Isfahan university of medical sciences; 2014. [Persian]

## The Effect of Contextual Factors on Health Information Seeking Behavior of Isfahan Diabetic Patients

Zare-Farashbandi F<sup>1</sup>, \*Lalazaryan A<sup>2</sup>, Rahimi AR<sup>3</sup>, Hassanzadeh A<sup>4</sup>

1-PhD. Associate Professor of Medical Librarianship and Information Science Department, Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2-Msc. Medical Librarianship and Information Science, department of management and medical informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (**corresponding author**)

**Email:** anasiklalazaryan@yahoo.com

3-PhD. Assistant Professor, Medical Librarianship and Information Science, Department of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4-Lecturer, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

### Abstract

**Introduction:** patient's contextual factors can affect their health information seeking behaviors proper health information seeking behavior can lead to diseases prevention and its improvement. The aim of this study was to examine the effect of contextual factors on the health information seeking behavior of diabetic patients in Isfahan.

**Method:** A survey method was used in this research. The statistical population consisted of 6426 diabetic patients of which 362 patients were selected by a no percentage stratified random sampling. Longo's information seeking behavior questionnaire was used to collect data and SPSS 20 software were used for analyzing gathered data.

**Results:** Pearson correlation index showed that by controlling age variable there was a direct relation between longevity of diagnosis and some information seeking factors ( $p < 0.05$ ,  $r > 0$ ). One-way ANOVA test showed that the average score of some factors of diabetic patient's information-seeking behavior during pregnancy are significantly higher than pre-diabetes and diabetes ( $p < 0.05$ ). Independent T- test showed that differences between some factors of health information seeking behavior in tow groups of people with a family history of diabetes and people without a family history of diabetes considered statically significant ( $p < 0.05$ ).

**Conclusion:** Some contextual factors such as longevity of diagnosis, type of the diabetes and family history of diabetes affect on the health information seeking behaviors of diabetic patients. Because of the importance of pre-diabetic patient's and pregnant diabetic women's health some arrangements should be set by health authorities in order to better transfer of health information to mentioned diabetic patients. By investigating factors that affect health information seeking behavior of patients with chronic disease their needed information could be transferred to them more effectively and it also can improve patient's self- care and prevent disease complication.

**Keyword:** diabetes, health information seeking behavior, contextual factors, Isfahan, Iran

Received: 17 July 2015

Accepted: 8 February 2016



Iranian Nursing  
Scientific Association

# Iranian Journal of Nursing Research

Vol. 11 No.1 (Serial 40) March-April 2016 ISSN:1735-7012

<b>Patient safety culture assessment in Seidolshohada hospital of Semiroom .....</b>	<b>8</b>
Afshari A, Piruzi M, Afshari S, Hejab K	
<b>Comparison of health-related quality of life in beta thalassemia major and healthy people in Dezful in 2015 ....</b>	<b>16</b>
Madmoli Y, Beiranvand R, Korkini N, Mashalchi H, Beigom Bigdeli shamloo M, Karimi H	
<b>The effect of self-management program after discharging on therapeutic adherence in patient with ischemic heart disease .....</b>	<b>24</b>
Zakerimoghadam M, Ebrahimi S. shahsavari H, Haghani H	
<b>The relationship between senses of coherence, self-compassion and personal intelligence with postpartum depression in women .....</b>	<b>33</b>
Narimani M, Ghaffari M	
<b>Investigating of quality of life and it's correlation with individual, social, economic, and health variables of retirees of Tabriz .....</b>	<b>41</b>
Malek M, Hassankhani H, Darvishpur Kakhki A, Asghari Jafarabadi M, Mansouri arani M, Mohammad nejad S	
<b>The effect of risk management education on the knowledge and performance of Operating room personnel at hospitals affiliated with Islamic Azad University Tehran Medical Sciences Branch in 1392 .....</b>	<b>50</b>
Salehi Zahed L, Asadi M, kordmir K	
<b>The relationship between emotional intelligence and coping styles of nurses in hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences .....</b>	<b>61</b>
Rostami M, Movaghar MR, Taghavi T, Mehran A	
<b>Life experiences of addicted wife:A qualitative study .....</b>	<b>75</b>
Nikbakht Nasrabadi AR, pashaei sabet F, Bastami AR	
<b>The Effect of Contextual Factors on Health Information Seeking Behavior of Isfahan Diabetic Patients .....</b>	<b>86</b>
Zare-Farashbandi F, Lalazaryan A, Rahimi AR, Hasssanزاده A	
<b>The determining of conformity rate of nursing cares regarding to respiratory system in neonates under mechanical ventilation in NICU .....</b>	<b>94</b>
Jafari Z, Khanali Mojeh L, Rassouli M, Baghestani A.R, Gahri Sarabi A.R, Shirinabady Farahani A, Shiri H	